

# Nu er det muligt at vaccinere mod Leishmaniose



Foto: Frédéric Decame

Leishmaniose er udbredt i landene omkring Middelhavet, bl.a. Italien, Grækenland, Spanien, Portugal og den sydlige del af Frankrig.

Har man planer om at tage sin hund med på ferie i disse lande, kan man nu få en forebyggende behandling hos dyrlægen.

Figur 1: Leishmaniose hos hund i Europa (Pr. P. BOURDEAU Original)

- Region med høj forekomst
- Potentiel udbredelse pga. tilstedeværelse af sandfluer
- Lande/zoner hvor tilfælde er beskrevet (men sjældne)
- Region med forekomst
- Zone med mulig udbredelse
- Importerede tilfælde

#### Ringte dokumenterede situationer:

- ? Tilfælde opstået i regionen?
- ? Importerede tilfælde?
- ? Sygdommen til stede i regionen?



\*The boundaries of the zones are not given precisely  
\*The map is derived from work on European studies and congresses  
(Bourdeau: EMOP 2004; WorldLeish4 2009; ECVD 2009; RESFIZ 2009)

(Courtesy Prof P. Bourdeau) shows the current broad situation in Europe.

**Virbac**  
ANIMAL HEALTH

www.virbac.dk

**Virbac**  
ANIMAL HEALTH



www.virbac.dk

## Rejser du SYDPÅ MED HUNDEN?

### Vaccinér din hund mod Leishmaniose i god tid inden ferien



Foto: Frédéric Decame



## Leishmaniose hos hund

Leishmaniose skyldes en parasitær infektion, som overføres mellem hunde ved bid af inficerede sandfluer – ikke at forveksle med myg.

Hvis din hund smittes kan den virke rask, selv om den er smittet.

Der kan gå helt op til 7 år efter en hund er smittet, før den eventuelt udvikler sygdommen.

## Symptomer



Symptomerne på Leishmaniose er bl.a. feber, tab af pels især omkring øjnene, vægttab samt problemer med hud og kløer.

Hundens indre organer kan også blive påvirket, og det kan føre til blodmangel, gift og nyresvigt.

Leishmaniose hos hunde har været kendt i mere end 20 år, og der er til dato ikke fundet nogen helbredende behandling.



Sygdommen kan i nogle tilfælde være dødelig.

[www.virbac.dk](http://www.virbac.dk)



Beskyt din hund og  
minimer risikoen

## Vaccinér hunden inden ferien



Den mest optimale beskyttelse fås ved at kombinere vaccination og insektafskrækkende midler. Vaccination hjælper immunforsvaret med at bekæmpe parasitten og insektafskrækkende midler, reducerer antallet af infektiøse sandfluebider.

For at opnå tilstrækkelig beskyttelse, skal din hund vaccineres 3 gange med 3 ugers mellemrum. Herefter vil det kun være nødvendigt med 1 årlig vaccination for at vedligeholde hundens immunforsvar.

Kontakt din dyrlæge mindst 10 uger før afrejse og få mere information om hvordan din hund bedst beskyttes.

## Vaccination er vigtigt!



Ekspertter vurderer, at der i dag er 2,5 millioner smittede hunde i Europa. Sandfluer kan også overføre sygdommen fra hund til mennesker.

Forebyggelse er derfor den bedste beskyttelse.

